

※ 参考資料 ※

日常生活自立度 《障害高齢者》

自立			
J1	生活自立	何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する	1. 交通機関等を利用して外出する
J2			2. 隣近所へなら外出する
A1	準寝たきり	屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない	1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
A2			2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
B1	寝たきり	屋内での生活は何らかの介助を用紙、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ	1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
B2			2. 介助により車いすに移乗する
C1			1. 自力で寝返りをうつ
C2			2. 自力では寝返りもうてない
		1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する	

日常生活自立度 《認知高齢者》

自立		
I	何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。	
II	日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。	
II a	家庭外で上記 II の状態が見られる	たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでにできたことにミスが目立つとき
II b	家庭内でも上記 II の状態が見られる。	服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応など一人で留守番ができない等
III	日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。	
III a	日中を中心として上記 III の状態が見られる。	着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為
III b	夜間を中心として上記 III の状態が見られる。	ランク III a に同じ
IV	日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。	ランク III に同じ
M	著しい精神状態や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。	せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等

ジェノグラム(家系図)の書き方

