

## 龍ヶ崎市感染症対策委員会次第

日 時 平成 30 年 11 月 19 日(月)  
午後 7 時～8 時 30 分  
場 所 龍ヶ崎市保健センター

1 あいさつ

2 委嘱状交付

3 協議事項

(1) 麻しん・風しんの流行状況及び市民への周知について

(2) 新型インフルエンザ等対応マニュアル（案）について

(3) その他

## 1. 麻しんの流行状況

茨城県内	
H30年2月	<p>&lt;患者1&gt;            居住地：常総保健所管内            年齢・性別：児童（男）            備考：フィリピンからの入国</p> <p>&lt;患者2&gt;            居住地：常総保健所管内            年齢・性別：20歳代 男性            備考：患者1が受診した医療機関の事務員</p>
H30年4月	<p>&lt;患者3&gt;            居住地：土浦保健所管内            年齢・性別：40歳代 男性            備考：麻しん予防接種歴は不明</p>
全国（茨城県外）	
H30年3月～現在	<p>◎沖縄県：台湾からの旅行者 → 二次感染を中心に感染拡大            その後、愛知県、東京都、神奈川県、福岡県、埼玉県等でも患者発生。感染が広がっている。</p>

## 2. 市の対応

H30年2月	<p>&lt;市公式ホームページ&gt;            一般市民向け、麻しんに関する情報提供</p> <p>&lt;市メール配信&gt;            麻しん風しん混合ワクチンの予防接種勧奨</p>
H30年4月	<p>&lt;市公式ホームページ&gt;            麻しん患者発生、麻しんに関する情報提供</p> <p>&lt;市内医療機関&gt;            麻しん患者発生に関する県からの情報提供をFAXにて周知</p> <p>&lt;市内小中学校&gt;            麻しん風しん混合ワクチンの予防接種勧奨及び麻しんについて            保護者あてチラシ作成及び配布            学校にも在校児童・生徒の予防接種履歴確認、接種推奨の依頼</p> <p>&lt;市内保育園・幼稚園&gt;            麻しん風しん混合ワクチン定期予防接種対象者へ接種勧奨及び麻しんについて            保護者あてチラシ作成及び配布（資料1）</p>
H30年5月	<p>&lt;MRI期の接種勧奨&gt;            1歳10か月の児で麻しん風しん混合ワクチン未接種者に電話で接種勧奨</p> <p>&lt;その他&gt;            適宜、市民からの問い合わせに対応</p>

## 【風しんの発生状況と対応について】

### 1. 風しんの流行状況

平成 30 年 8 月頃から関東を中心に風しんが流行

	H25	H26	H27	H28	H29	H30
茨城県	123	4	3	0	1	55
全国	14,344	319	163	126	93	1,692

※平成 30 年の人数は、茨城県は 11 月 5 日現在、全国は 10 月 28 日現在

11 月 5 日現在、県のホームページに掲載されている患者 55 名のうち 54 名（98%）が成人となっており、男女別にみると男性 49 名（89%）、女性 6 名（11%）と男性が顕著に多い。男性患者の年齢をみると、40 代が 20 名（41%）と最も多く、次いで 30 代が 14 名（29%）、50 代が 10 名（20%）、20 代が 4 名（8%）となっており、予防接種の機会がなかった世代に多い状況となっている。なお、茨城県内の患者 55 名のうち竜ヶ崎保健所管内の患者は 16 名であった。

### 2. 市の対応



H30 年 9 月	<p>&lt;市民への周知&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○風しん流行の注意喚起及び予防接種勧奨のチラシ配布（資料 2） <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳幼児健診時</li> <li>・特定健診時（成人）</li> <li>・婦人科検診時</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;市内保育園・幼稚園&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○保護者向けに風しん流行の注意喚起及び予防接種勧奨のチラシ配布</li> </ul> <p>&lt;市内企業（工業団地）&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○働き盛りの年代に風しんが流行しているため、市内工業団地の従業員に対して、風しん流行の注意喚起及び予防接種勧奨のチラシを配布。</li> </ul>
H30 年 10 月	<p>&lt;市内小中学校&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○養護教諭部会にて風しん流行の注意喚起及び予防接種勧奨のチラシを配布。教職員及び児童生徒への対応を依頼。</li> </ul> <p>&lt;市民への周知&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○上記 継続</li> </ul>
H30 年 11 月	<p>&lt;市職員への周知&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○県作成の風しん流行の注意喚起及び予防接種勧奨のチラシを配布。（資料 3）</li> </ul> <p>&lt;市民への周知&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○上記 継続</li> </ul>

別紙 1

ワクチン接種体制変更点まとめ

内容	変更前	変更後
接種対象者	56,000名 (H24.4.1 現在人口)	46,000名 (H30.4.1 現在人口)
1日の接種名数	2,400名	① 妊婦, 基礎疾患を有する方 1,440名 ② 1歳~3歳までの小児 1,125名 ③ 4歳以上 1,620名
接種日数	約23日	37日
接種率	全対象者の6割	① ~⑨の対象者それぞれで接種率を算出
接種体制	実施時間 9:00~21:00 (12時間) 医師・看護師 3交代 職員 2交代	実施時間 9:00~18:00 (9時間) 医師・看護師 2交代 職員 1交代
医師・看護師数 (1日)	医師 : 6名×3交代=18名 看護師 : 11名×3交代=33名	① 医師 : 4名×2交代=8名 看護師 : 5名×2交代=10名 薬剤師 : 4名×2交代=8名 ② 医師 : 5名×2交代=10名 看護師 : 6名×2交代=12名 薬剤師 : 5名×2交代=10名 ③ 医師 : 4名×2交代=8名 看護師 : 5名×2交代=10名 薬剤師 : 4名×2交代=8名
職員数 (1日)	職員 35名×2交代=70名 保健師 : 4名	ワクチン接種班職員 : 5名 他班職員 : 18名 保健師 : 4名

# 新型インフルエンザ等対策備蓄用 消毒用アルコール

製品名	医薬品の種類	性状	1回当りの使用量	1 L 当たりの使用回数	組成	薬効	使用期限	容量
ウエルパス 手指消毒液0.2% 丸石製薬株式会社	医療用医薬品	液状	約3.0mL	約333回	100mL中 ベンザルコニウム塩化物 0.2g 及び添加物として プロピレングリコール, ミリスチン酸イソプロピル, エタノール, その他4成分 含有  エタノール約80 (v/v) %	日本環境感染学会から提案 されている「生体消毒薬の有 効性評価指針：手指衛生20 11」に準拠し、ASTM (US-TFM) E117 4 (医療従事者対象の衛生 (学) 的手指消毒薬としての 評価法) を用いて薬効評価を 行い、基準を満たすことを確 認している。	3年	  5L 1L 500mL 300mL 100mL
ウェルフォーム 丸石製薬株式会社	第2類医薬品	泡状	約1.2mL	約833回	100mL中 クロルヘキシジングルコン酸塩0.2g 及び添加物として ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン 共重合体, グリチルレチン酸, N-ココイル-L-アルギニンエチルエステ ルDL -ピロリドンカルボン酸塩, トコフェロール酢酸エステル, エタノール 含有  エタノール約80 (v/v) %	同上	同上	  1L手動ディスペンサー用 360mL 180mL 80mL×10

ウエルパスに  
比較して約  
2.5倍